

薬剤散布には、農薬使用基準を遵守し、隣接園・他品種に飛散しないよう注意して防除する。

満開日	月	日	落花期(80%落花が見られた日)	月	日
-----	---	---	------------------	---	---

回数	防除時期	薬剤と調合量(倍率)【水 100%+展着剤】				散布月日	散布薬剤名
		早生種 (6月末~7月上旬収穫)		中生種・晩生種			
1	3月中旬 発芽前	石灰硫黄合剤	10L	10倍	同左		
2	4月中旬 開花直前	ICボルドー412	3.3kg	30倍	"		
3	4月下旬 落花直後	ロブラール水和剤	66g	1500倍	"		
		マイコシールド	66g	1500倍			
		アドマイヤー水和剤	50g	2000倍			
	4月下旬	コンピューザーMM 10アール当たり120本設置 対象害虫 ナシメシクイ、モモハモグリガ、ハマキムシ類					
4	5月上旬	カスケード乳剤	50ml	2000倍	同左		
		イオウフロアブル	200ml	500倍			
		アプロードフロアブル	100g	1000倍			
		マイコシールド	66g	1500倍			
5	5月中旬	ベルコートフロアブル	50ml	2000倍	"		
		サイアノックス水和剤	100g	1000倍			
6	5月下旬	オンリーワンフロアブル	50ml	2000倍	"		
		ダズバンDF	33g	3000倍			
7	6月上旬	ダコニール1000	100ml	1000倍	"		
		バリアード顆粒水和剤	50g	2000倍			
8	6月中旬	ストロビードライフロアブル	50ml	2000倍	"		
		オサダン水和剤	100g	1000倍			
9	6月下旬	ダコニール1000	100ml	1000倍	"		
		アーデント水和剤	100g	1000倍			
		中生種 (7月中旬~7月下旬収穫)			晩生種 (8月上中旬収穫)		
10	7月上旬	ナリアWDG	50g	2000倍	同左		
		アルバリン顆粒水溶剤	50g	2000倍			
11	7月中旬				ベルコートフロアブル	50ml	2000倍
					バリアード顆粒水和剤	50g	2000倍
					カネマイトフロアブル	100ml	1000倍
12	7月下旬				ストロビードライフロアブル	50ml	2000倍
					アルバリン顆粒水溶剤	50g	2000倍
13	収穫後	ダズバンDF	33g	3000倍	"		
14	9月中旬	ICボルドー412	3.3kg	30倍	"		

注 登録抹消薬剤 (次の農薬はネクタリンでは使用できません。) 殺菌剤 サニパー 硫酸亜鉛

登録農薬及び使用基準

殺菌剤	倍率	使用時期/回数	殺虫剤	倍率	使用時期/回数
4-12式ボルドー液			アーデント水和剤	1000	収穫前日まで/3
ICボルドー412	30~50		アディオン乳剤	2000~4000	収穫7日前まで/3
アンピルフロアブル	1000	収穫前日まで/3	アドマイヤー水和剤	1000~2000	収穫14日前まで/2
イオウフロアブル	500	/	アプロードフロアブル	1000	収穫45日前まで/2
インダーフロアブル	5000	収穫前日まで/4	アルバリン顆粒水溶剤	2000	収穫前日まで/3
オーシャイン水和剤	2000~3000	収穫前日まで/3	カスケード乳剤	2000~4000	収穫21日前まで/2
オンリーワンフロアブル	2000	収穫前日まで/3	ガットキラール剤	50~100	休眠期/3
コサイドDF	500	開花前まで/-	サイアノックス水和剤	1000	収穫21日前まで/2
スコア顆粒水和剤	2000	収穫前日まで/2	スプレーオイル	25~50	発芽前/-
ストロビードライフロアブル	2000	収穫前日まで/3	ダズバンDF	3000	収穫14日前まで/2
石灰硫黄合剤	7~10	発芽前/-	ダイアジノン水和剤	1000~1500	収穫21日前まで/3
ダコニール1000	1000	収穫前日まで/2	ダントツ水溶剤	2000~4000	収穫3日前まで/3
チオノックフロアブル	500	収穫30日前まで/5	バリアード顆粒水溶剤	2000~4000	収穫3日前まで/2
デランフロアブル	600~1000	収穫90日前まで/1	モスピラン水溶剤	4000	収穫3日前まで/3
ナリアWDG	2000	収穫前日まで/2	オサダン水和剤25	1000~1500	収穫7日前まで/2
ベルコートフロアブル	1500~2000	収穫前日まで/2	カネマイトフロアブル	1000~1500	収穫3日前まで/1
マイコシールド	1500	収穫28日前まで/5	コテツフロアブル	2000~4000	収穫7日前まで/2
ロブラール水和剤	1000~1500	収穫前日まで/3	コロマイト乳剤	1000	収穫7日前まで/1
			マイトコーネフロアブル	1000~1500	収穫3日前まで/1

