

薬剤散布には、農薬使用基準を遵守し、隣接園・他品種に飛散しないように注意して防除する。
 農薬散布は対象病害虫に対し散布タイミング、散布量が大切です。

満開日	月	日	落花期(80%落花が見られた日)	月	日
-----	---	---	------------------	---	---

回数	防除時期	薬剤と調合量(倍率) 【水 100 L + 展着剤】		散布量 10a当り	発生病害虫	注意事項	散布 月日	散布薬剤名
		カリカリ出荷用						
1	休眠期 11月下旬 ~12月末	スプレーオイル 石灰硫黄合剤	2L 50倍 10L 10倍	350 L	黒星病 かいよう病 変葉病 カイガラムシ類	1.温暖な日を選び丁寧に散布する。 2.コスカシバの秋期防除が徹底できなかった園は被害部のヤニを取除き、 <u>ガットキラー乳剤 100 倍液</u> を寄生部の枝幹に散布する。		
2	展葉初期	ダイアジノン水和剤34 マイコシールド	100g 1000倍 66g 1500倍	350 L	かいよう病 アブラムシ類 ウメケムシ	1.かいよう病の発生園ではこの回から4月下旬まで重要な防除となるので丁寧に散布する。 2.かいよう病防除にアグレプト水和剤、アグリマイシン 100 は使用後から収穫日数が長いので使用しない。		
3	4月下旬	イオウフロアブル マイコシールド	200ml 500倍 66g 1500倍	400 L	黒星病 菌核病	1.コスカシバの寄生部からヤニ(虫糞)の排出が盛んになるので見つけたい捕殺する。 2.コスカシバ防除としてスカシバコンを10a当り50~100本を基準に設置し防除に努める。		
4	5月上旬	スコア顆粒水和剤 バリアード顆粒水和剤	33g 3000倍 25g 4000倍	400 L	黒星病 かいよう病 アブラムシ類	1.黒星病の感染期になるので丁寧に散布する。 2.バリアード顆粒水和剤は蚕毒が非常に強いので散布には充分注意。桑園隣接園では使用しない。		
5	5月中旬	ストロビードライフフロアブル モスピラン水溶剤	33g 3000倍 25g 4000倍	400 L	黒星病 アブラムシ類 ウメケムシ	1.モスピラン水溶剤は蚕毒が非常に強いので散布には充分注意する。桑園隣接園では使用しない。		
		カリカリ出荷の農薬散布は5月中旬までとする。						
		専用過熟						
6	5月下旬	スコア顆粒水和剤 アディオオン水和剤	33g 3000倍 50g 2000倍	400 L	黒星病 アブラムシ類 ウメケムシ	1.専用過熟小梅・中大梅は、今回と次回に防除を行う。 2.アディオオン水和剤は合成ピレスロイド剤なので指定地域で使用する。		
7	6月上旬	ストロビードライフフロアブル	33g 3000倍	400 L	黒星病			
8	7月中旬 収穫後	アプロード水和剤	100g 1000倍	400 L	カイガラムシ類	1.アブラムシの多い場合は収穫後にバリアード顆粒水和剤 4000 倍を散布する。		
9	9月中旬 ~下旬	スミチオン乳剤	100ml 1000倍	450 L	コスカシバ	1.主幹、主枝を中心に樹全体を洗うように散布する。		

* 薬剤散布は樹の上からも散布し、新梢先端(徒長枝)にも十分量薬液が掛かる様に散布すること。

注 登録抹消薬剤 (次の農薬はうめでは使用できません。)

殺菌剤 サニパー

防除暦使用農薬一覧(抜粋)

印は合成ピレスロイド剤のため使用地域で使用する。

殺菌剤			殺虫剤		
農薬名	倍率	使用時期/回数	農薬名	倍率	使用時期/回数
アグリマイシン 100	1000	収穫90日前まで/2回	DDVP乳剤50	1000~2000	収穫7日前まで/6回
アグレプト水和剤	1000~2000	収穫90日前まで/2回	アグロスリン水和剤	2000	収穫7日前まで/3回
イオウフロアブル	500	-/4回	アディオオン水和剤	2000	収穫前日まで/2回
オーシャイン水和剤	3000	収穫前日まで/3回	アドマイヤー水和剤	2000	収穫21日前まで/2回
オーソサイド水和剤80	800~1000	収穫21日前まで/3回	アプロード水和剤	1000	収穫後~落葉前/2回
スコア顆粒水和剤	3000	収穫7日前まで/3回	アルバリン顆粒水溶剤	2000	収穫7日前まで/3回
ストロビードライフフロアブル	2000~3000	収穫7日前まで/3回	オリオン水和剤40	1000	収穫7日前まで/3回
石灰硫黄合剤	8	発芽前まで	ガットキラー乳剤	50~100	休眠期/2回
デランフロアブル	2000	収穫45日前まで/1回	スプラサイド水和剤	1500	収穫14日前まで/2回
トップジンM水和剤	1000~1500	収穫21日前まで/3回	スプレーオイル	30~50	12月/-
マイコシールド	1500	収穫21日前まで/4回	スミチオン乳剤	1000~2000	収穫14日前まで/2回
ロブラール水和剤	1000~1500	収穫45日前まで/2回	ダイアジノン水和剤35	1000~1500	収穫21日前まで/2回
			バリアード顆粒水和剤	4000	収穫前日まで/2回
			モスピラン水溶剤	2000~4000	収穫7日前まで/2回

* 防除暦以外の農薬散布をする際、散布前に園協指導課まで御相談下さい。電話 22-2000 FAX 53-3045