

# 西洋梨病害虫防除暦 (有袋栽培)

**薬剤散布には、農業使用基準を遵守し、隣接園・他品種に飛散しないように注意して防除する**  
**農業散布は対象病害虫に対し散布タイミング、散布量が大切です。**

満開日	月	日	落花期 (80%落花が見られた日)	月	日
-----	---	---	-------------------	---	---

回数	防除時期	薬剤と調合量(倍率) 【水 100% + 展着剤】	散布量 10a 当り	発生病害虫	注 意 事 項	散布 月日	散布薬剤名
1	発芽前	石灰硫黄合剤 10L 10倍	350 L	胴枯病	1.風のない日を選んで丁寧に散布する。 2.ハダニ類、カイガラムシ類の多い場合は <b>スプレーオイル</b> 50倍を散布する。 3.ナシオオシンクイの被害芽を剪除する。 4.胴枯病の発生園では被害枝を切り取りまたは患部を削り <b>トップジンM<sup>®</sup></b> を塗布する。		
2	りんぼう脱期	ICボルドー 412 3.3kg 30倍	350 L	輪紋病			
3	開花前	フェニックス顆粒水和剤 25g 4000倍	350 L	アブラムシ類 ハマキムシ類			
4	落花直後	トップジンM水和剤 66g 1500倍	350 L	輪紋病			
5	5月上旬	スコア顆粒水和剤 50g 2000倍 ダイアジノン水和剤 100g 1000倍	350L	輪紋病 アブラムシ類 ハマキムシ類			
6	5月中旬	キノンドーフロアブル 100ml 1000倍 トップジンM水和剤 66g 1500倍 バリアード顆粒水和剤 33g 3000倍 クレフノン 1000g 100倍	350 L	輪紋病 アブラムシ類	1.有機銅キャブタン剤を散布するときはクレフノンを加用するとサビ果の発生を防止できる。		
7	5月下旬 (袋掛け前)	ストロビードライフロアブル 50g 2000倍 ダイアジノン水和剤 100g 1000倍 クレフノン 1000g 100倍	350 L	輪紋病 アブラムシ類 シンクイムシ類 カイガラムシ類	1.輪紋病の胞子飛散がはじまるので防除に注意する。 2.毛振り前はサビ果を生じやすいので乳剤類を使用しない。		
8	6月上旬	ストロビードライフロアブル 50g 2000倍 サイアノックス水和剤 100g 1000倍 クレフノン 1000g 100倍	400 L	輪紋病 アブラムシ類 シンクイムシ類	1.ナシヒメシンクイの被害が出始めるので果実を重点に丁寧に散布する。		
9	6月中旬	ベルコート水和剤 100g 1000倍 または オキシラン水和剤 166g 600倍 オサダン水和剤 100g 1000倍	400 L	輪紋病 ハダニ類	1.ダニ類の発生が多くなるので丁寧に散布する。 2.ベルコート水和剤は、ル・ルクチェ等薬害を生ずるのでオキシラン水和剤を使用する。		
10	6月下旬	ストロビードライフロアブル 50g 2000倍	400 L	輪紋病 黒星病	1.6月下旬から7月上旬にかけてカメムシの飛来が多くなるので注意する。		
11	7月上旬	ベルコート水和剤 100g 1000倍 または オキシラン水和剤 166g 600倍 ダイアジノン水和剤 100g 1000倍	400 L	輪紋病 黒星病 シンクイムシ類 カイガラムシ類	1.シンクイムシ類の多発する時期であるので丁寧に散布する。 2.ベルコート水和剤は、ル・ルクチェ等薬害を生ずるのでオキシラン水和剤を使用する。		
12	7月中下旬	ダニゲッターフロアブル 50ml 2000倍 オキシラン水和剤 166g 600倍 アルパリン顆粒水溶剤 50g 2000倍	400 L	輪紋病 シンクイムシ類 カイガラムシ類 ハダニ類	1.高温乾燥期となり葉やけなど薬害が発生しやすくなるので朝夕など涼しい時に散布する。		
13	8月上中旬	キノンドーフロアブル 100ml 1000倍	400 L	輪紋病	1.ダニ類の発生がある場合には、コロマイト乳剤 1000倍を加用する。		
14	8月下旬~ 9月上旬	キノンドーフロアブル 100ml 1000倍	400 L	輪紋病	1.西洋梨の輪紋病は収穫直前まで感受性が高いので十分防除を行う。 2.シンクイムシの発生が多い場合は <b>モスピラン</b> 水溶剤 2000倍、 <b>ロディー</b> 水和剤 1000倍を散布し防除する。		
15	9月中下旬	オキシラン水和剤 166g 600倍	400 L	輪紋病			
16	収穫終了後	<b>4-8式ボルドー液</b> 硫酸銅 400g 生石灰 800g	350 L	輪紋病	1.大切な防除なので手散布で丁寧に。行う。		

西洋梨に登録が無い農薬			有袋と無袋で登録が違う農薬		
農薬名	日本ナシ	西洋ナシ	農薬名	有袋	無袋
マイクロデナボン水和剤 85	収穫45日前 / 3	登録無し	スミチオン水和剤 40	収穫14日前 / 6	収穫21日前 / 6
リンナックル水和剤	収穫45日前 / 3	登録無し	スプラサイド水和剤	収穫7日前 / 3	収穫45日前 / 2
マデック乳剤	収穫7日前 / 1	登録無し	サイアノックス水和剤	収穫7日前 / 3	収穫45日前 / 3

\* 防除暦以外の農薬散布をする際、散布前に園協指導課まで御相談下さい。 0265 - 22 - 2000 FAX0265 - 53 - 3045